

ВНИМАНИЕ!



Коричнево-мраморный клоп

Halymorpha halys Stel

Экспериментальная

мониторинговая ловушка Дельта (производство ФГБУ «ВНИИГР»)

НАЗНАЧЕНИЕ

- В производственных садах и на полях – 1 ловушка на 1 га;
- В частном секторе, на дачных участках – 1 ловушка на 1 участок;
- В условиях закрытого грунта – 1 ловушка на 1000 м².

Ловушка для массового


отлова «Объемная»

НАЗНАЧЕНИЕ

1. Мониторинг наличия вредителя.
2. Как средство для локального ограничения численности вредителя (в т.ч. в ЛПХ).

Создание скопления вредителя с последующей точечной обработкой ХСЗР.

- В производственных садах и на полях – 1 ловушка на 1 га;
- В частном секторе, на дачных участках – 1 ловушка на 1 участок;
- В условиях закрытого грунта – 1 ловушка на 1000 м².



Управление сельского хозяйства
Муниципального образования
Крымский район

ТЕЛЕФОН 8(861-31) 4-80-87

8(861-31) 4-80-78

ВНИМАНИЕ!



Коричнево-мраморный клоп

Halymorpha halys Stel

ПОВРЕЖДАЕМЫЕ РАСТЕНИЯ

Мраморный клоп может повреждать практически все плодовые и багчевые культуры, ягодники, виноградники, декоративные растения, фасоль, сою, кукурузу, сорную растительность. Насекомое питается цветами гибискуса, плодами паслена черного, стеблем целозии, шпинатом, спаржей, стручками фасоли. В общей сложности для этого вида известно более 100 видов растений-хозяев.

СИМПТОМЫ ПОВРЕЖДЕНИЙ


Появление падалицы, характерные проколы листьев и плодов с образованием некротических зон.

ПУТИ РАСПРОСТРАНЕНИЯ

С помощью транспортных средств и с грузами, особенно со строительными конструкциями, растениями (саженцами) и растительной продукцией из зоны его естественного распространения (Китай, Япония, Корея, Тайвань), из зон его недавнего распространения – США и страны Европы (Швейцария, Германия, Франция, Италия и т.д.).

МЕТОДЫ ВЫЯВЛЕНИЯ И ИДЕНТИФИКАЦИИ

Клопы выявляются визуальным методом. Взрослые клопы длиной 12-17 мм, коричневатые или сероватые, окраска в целом сильно варьирует. Характерной особенностью является наличие светлых колец на усиках и чередующихся светлых и темных участков на видном сверху тонком боковом крае брюшка. Ноги коричневые со слабой беловатой крапчатостью. Запаховые железы расположены на нижней стороне груди между первой и второй парами ног и на верхней стороне брюшка.



Начальник Крымского районного отдела
филиала ФГБУ Россельхозцентр

ТЕЛЕФОН 8(861-31) 4-58-95